Znáš ptáky, kteří hnízdí ve tvém okolí?

POZNÁVÁME PŘÍRODU

ČÁP ČERNÝ

Na rozdíl od známějšího čápa bílého, který má černé jen letky, je celý černý, s bílým břichem a nápadně červeným zobákem a nohama. Hnízdí v okolních lesích na vysokých stromech, lovit létá do vesnice na potoky a rybníky – jeho hlavní potravou jsou totiž ryby. Na konci léta odlétá do rovníkové Afriky, odkud se zase vrací v dubnu.

SKOREC VODNÍ

Pokud se budete pozorně dívat, zahlédnete na říčkách a potocích v naší vesnici mistra v potápění mezi ptáky. Tmavohnědý pták s bílou náprsenkou sedí obvykle na kameni ve vodě a legračně podřepává. Potom se vrhá pod vodu, kde hledá potravu pod kameny, a to v létě i v zimě.

CHŘÁSTAL POLNÍ

Koncem jara se po setmění louky v okolí vesnice rozdrnčí pronikavými skřeky chřástalů polních. Nenápadně zbarvení samci, které je velmi obtížné pozorovat, koncertují celou noc a označují tak své teritorium. Louky v okolí Sobotína patří k pravidelným hnízdištím tohoto chráněného druhu.

RORÝS OBECNÝ

Tento druh ptáka je zcela jedinečný tím, že žije ve vzduchu. V letu rorýsi pijí, loví potravu, spí, namlouvají se. Sedí pouze v době hnízdění na vejcích a při krmení mláďat. Mláďata po vylétnutí z hnízda stráví ve vzduchu dva až tři roky, než poprvé přistanou! V naší vesnici hnízdí rorýsi pravidelně na několika vyšších budovách, jako je škola nebo budova bývalé rudoltické rychty.

Poznáš stromy, které rostou ve tvém okolí?
Zkus uhádnout, jak vypadá kmen stromu.

POZNÁVÁME PŘÍRODU

SMRK ZTEPILÝ

Tento dnes nejběžnější strom okolních lesů tvořil dříve jen jejich menší část, navíc rostl především vysoko v horách. Umělé zalesňování přivedlo smrky i do míst, kde původně vůbec nerostly. Na hřebenech hor trpí uměle vysazené smrky znečištěným ovzduším, takže místy došlo k jejich rozsáhlému odumírání.

BUK LESNÍ

Tento strom byl dříve nejběžnější dřevinou jesenických lesů, postupně byl vytlačen vysazovaným smrkem. V okolí Sobotína se ovšem zachovala řada krásných bučin, ve kterých na jaře před olistěním stromů vykvétá mnoho zajímavých rostlin. V posledních letech se díky úsilí Lesů ČR porosty bučin opět rozšiřují.

JAVOR

V bučinách i nižších polohách rostou dva druhy javorů, javor klen a javor mléč, s charakteristicky dlanitě zubatými listy a létajícími vrtulovitými plody. Na podzim oživují okolní lesy žlutou a červenou barvou vadnoucího listí. Na jaře a v létě si můžete vyzkoušet rozdíl mezi těmito druhy, který dal jednomu jméno – z řapíků listů mléče po odtržení pomalu vytéká bílá tekutina.

OLŠE LEPKAVÁ

Strom, doprovázející břehy vodních toků od údolí do hor je zvláštní – přesto, že jde o listnáč, najdeme na něm šišky. Ve skutečnosti nejde o šišky, ale o dřevnaté šištice, z nichž na konci zimy vypadávají malá semínka. Na rozdíl od javoru jsou i vadnoucí a padající listy olše stále zelené.